

# HPV-vaccination Guideline

## Region Nordjylland

Patient gruppe	Anbefaling
Alle ikke-gravide kvinder, uanset alder	Følge screeningsprogram
Kvinder, 13-25 år	Anbefales HPV-vaccination
Kvinder, >25 år	HPV-vaccination <u>kan</u> anbefales (se "Facts")
Tidligere behandlet cervix prækankrose eller behandlede condylomer	Anbefales HPV-vaccination
Immunsupprimerede (kvinder & mænd)	Anbefales HPV-vaccination
Drenge/mænd	HPV-vaccination <u>kan</u> anbefales (se "Facts")

# HPV- OG VACCINATIONS FACTS

- Livstidsrisikoen for at få en HPV-infektion er ca 80%, og for at livmoderhalskræft er ca 1%(ca 400/år i DK )
- Hpv er årsag til ca 1000 concertilfælde/år i DK (Cervix, Vagina, Vulva, anal, penis, oro-pharynx, tonsiller, pharynx).
- HPV-vaccination formodes at forebygge mere end 70% af alle HPV-relaterede cancersygdomme hos mænd og kvinder.
- HPV-vaccination mod HPV-type 6 og 11 forebygger ca 90% af condylomer hos begge køn.
- HPV-vaccinens relative risicoreduktion for HPV-relateret sygdom er ens for alle aldre, men den absolutte risicoreduktion afhængig af individuelle risikofaktorer og adfærd.
  - Alder
  - Antal seksuelle partnere, tidligere og aktuelt.
  - Tidligere behandlingskrævende celleforandringer eller condylomer.
  - Tobaksrygning
  - Medfødt eller induceret nedsat immunforsvar.
- HPV-vaccination af gravid bør undgås, men indicerer ikke afbrydelse af svangerskabet ved accidental vaccination i graviditet.
- Ammende kvinder kan godt vaccineres.
- HPV-vaccination er uden alvorlige bivirkninger, og kan tilbydes/gives til alle.
- Risikoen for bivirkning af HPV-vaccinen er 1000 gange mindre end risikoen for at få livmoderhalskræft !