

## Opgaver ved lav saturation og eventuel opfølgning

Instruksen beskriver opgaver ved lav saturation hos KOL-patienter, der via TeleCare Nord har telemedicinsk udstyr i hjemmet.

Blandt de patienter, der løbende måler saturation, må det forventes, at enkelte vil have en saturation under laveste acceptable niveau på 88 %. Hvis saturationen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau efter fejlretning og yderligere oplæring i hjemmet, kan patienten komme til en subakut arteriepunktur og vurdering med henblik på ordination eller justering af nasal iltbehandling. Derudover vurderes evt. behov for ekstra ambulans kontrol samt, hvis det fremgår af henvisningen evt. behov for justering af alarmgrænser for saturation. Dette foregår via hospitalets Lungemedicinske Afdeling eller lungeambulatorium.

Subakut A-punktur foretages indenfor **2 hverdage** efter modtagelse af henvisning og er rettet på patienter tilknyttet TeleCare Nord ifølge Samarbejdsaftale om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

### Aktør

Almen praksis.

### Kompetencer

Lægefaglige kompetencer.

### Formål

- At sikre patienter med lav saturation får udredt eventuelt behov for eller justering af nasal iltbehandling.
- At sikre en vurdering af alarmgrænser for saturationsmåling, hvis dette fremgår af henvisning.

### Handling

Når saturationen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau skal sygeplejerske fra kommunen, i samråd med patienten, kontakte patientens praktiserende læge med henblik på yderligere tiltag. Dette er gældende ved patienter, hvor det er den kommunale sygeplejerske, der følger op på de telemedicinske data.

Ved patienter hvor hospitalet har ansvaret for KOL-behandlingen kan kommunen selv kontakte hospitalet.

### Henvisning fra praktiserende læge

Der sendes en sygehushenvisning til Lungemedicinsk Afdeling. I første felt, der kan skrives i, skal stå "KOL TeleCare Nord" og det skal tydeligt fremgå, at det er mhp subakut A-punktur. Derudover skal henvisningen indeholde problemstilling, relevant information samt patientens telefonnr.

Ved behov for justering af alarmgrænser for saturation skal dette fremgå af henvisningen.

### Resultat og eventuel opfølgning

Læge eller sygeplejerske fra hospitalet sender epikrise til praktiserende læge med resultat og konklusion samt evt. nye alarmgrænse. Derudover orienterer hospitalet kommunen via korrespondancemeddelelse, så kommunen kan tilrette evt. nye alarmgrænser.

Hvis der af hospitalet aflæses andre værdier, end de lungerelaterede værdier, aktuelt saturation, som kræver yderligere vurdering, vil der fra hospitalet blive sendt information om dette til patienten, kommunen og den praktiserende læge med henblik på vurdering af værdierne hos den praktiserende læge.