



## Opgaver ved lav saturation – Kommune

Instruksen er relateret til opgaver i forbindelse med lav saturation hos borgere med KOL, der via TeleCare Nord har telemedicinsk udstyr i hjemmet.

### Formål

Der er behov for at sikre at borgere med lav saturation i sygehus regi får udredt eventuelt behov for eller ændring af iltbehandling samt en vurdering af alarmgrænser for saturationsmåling.

### Aktør

Kommune.

### Kompetencer

Sundhedsfaglige kompetencer.

### Handling

Blandt de borgere, der følges i kommunen, må det forventes, at enkelte vil have en saturation under laveste acceptable niveau på 88 %. Hvis ikke værdierne kan bringes til et acceptabelt niveau efter fejlretning og yderligere oplæring i hjemmet kan der være behov for en kontakt til sygehusets lungeambulatorium til en subakut arteriepunktur (A-punktur) og vurdering med henblik på ordination eller justering af nasalt ilttilskud. Samtidig vurderes om der er behov for justering af borgerens alarmgrænser, aktuelt for saturation. Dette tilbydes i sygehusets lungeambulatorium indenfor to hverdage. Kontakten til praktiserende læge eller sygehus sker altid i samråd med borgeren.

### Borgeren følges for sin KOL hos praktiserende læge

- Borgerens læge kontaktes med henblik på yderligere tiltag.
- De praktiserende læger kan henvise disse borgere til en subakut arteriepunktur.
- Læge eller sygeplejerske fra sygehuset sender epikrise til den praktiserende læge samt korrespondancemeddelelse til kommunen med resultatet og konklusionen af undersøgelsen samt eventuelle nye alarmgrænser.

### Borgeren følges for sin KOL af sygehuset og sygehuset har ansvaret for KOL behandlingen

- Kommunen kan kontakte sygehuset direkte med henblik på vurdering af behov for subakut arteriepunktur. Kontakten er telefonisk.
- Hvis sygehuset vurderer behov for ordination af eller justering af nasalt ilttilskud eller behov for justering af borgerens lungerelaterede alarmgrænser, aktuelt saturation, informeres kommunen om dette i en korrespondancemeddelelse. Derudover sendes epikrise til den praktiserende læge.
- Hvis der af sygehuspersonalet aflæses andre værdier end de lungerelaterede værdier, aktuelt saturation, som kræver yderligere vurdering, vil der fra sygehuset blive sendt information om dette til borgeren, kommunen og den praktiserende læge med henblik på vurdering af værdierne hos den praktiserende læge.