KOL TeleCare Nord

Grænseværdier

Der er fastsatte forudindstillede grænseværdier for KOL-gruppen. Disse er fastlagt i samarbejde mellem almen praksis, ved Nord-KAP, og Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Der er fastlagt to grænseværdier. Hensigten er at undgå for mange unødige alarmer og kontakter til almen praksis. Den gule er en gråzone grænse, hvor kommunen reagerer og vurderer. Dette er ikke en grænse, som forventes at indebære en risiko for patienten, men hvor man ofte kan finde en god forklaring på årsagen. Den egentlige grænseværdi for kontakt til egen læge vil være i den røde zone. Her må man forvente at patienten er dårlig, måske i en exacerbation med feber. Her vil en kontakt til lægen være indiceret.

Foruddefinerede grænseværdier

Grøn: Normale forhold.

Gul: Patients værdier bør observeres – kommunen kontakter evt. patient.

Rød: Ikke normale forhold. Kommunen kontakter patient mhp. evt. intervention/behov for at kontakte egen læge.

Grænseværdier	**Rød lav**	**Gul lav**	Normalområde	**Gul høj**	**Rød høj**
Saturation	< 88	≥ 88 og < 92	≥ 92		
Systolisk blodtryk	< 90	≥ 90 og ≤ 110	> 110 og < 160	≥ 160 og < 180	≥ 180
Diastolisk blodtryk			< 90	≥ 90 og ≤ 110	> 110
Puls - hvile	≤ 50	> 50 og < 60	≥ 60 og < 110	≥ 110 og < 130	≥ 130
Vægt - kg	Vægt ≤ -2	≤ -1 og > -2	Vægt -1 og + 2	≥ 2 og < 4	≥ 4
Rejse-sætte-sig-test - ændring	≤ -3	> 3 og ≤ -2	> -2		
CAT - ændring			CAT <+2	≥ 2 og < 3	≥ 3

Vægt: Patients aktuelle vægt er referencepunkt og er uden hensyntagen til BMI.
Rejse-sætte-sig-test og CAT: Referencepunkt ved Rejse-sætte-sig- test og CAT er ud fra patients formåen/tilstand i stabil fase mhp. at kunne detektere en forværring i patients tilstand.

Foruddefinerede grænseværdier, som de vises i den telemedicinske løsning -Telma

Grænseværdier	**Rød lav**		**Gul lav**		**Gul høj**		**Rød høj**	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
Saturation		< 88	≥ 88	< 92				
Systolisk blodtryk		< 90	≥ 90	≤ 110	≥ 160	< 180	≥ 180	
Diastolisk blodtryk					≥ 90	≤ 110	> 110	
Puls - hvile		≤ 50	> 50	< 60	≥ 110	< 130	≥ 130	
Vægt -kg		≤ -2	> -2	≤ -1	≥ 2	< 4	≥ 4	
Rejse-sætte-sig-test – ændring		≤ -3	> -3	≤ -2				
CAT - ændring					≥ 2	< 3	≥ 3	

Vægt: Patients aktuelle vægt er referencepunkt og er uden hensyntagen til BMI.
Rejse-sætte-sig-test og CAT: Referenceværdi ved Rejse-sætte-sig- test og CAT er ud fra patients formåen/tilstand i stabil fase mhp. at kunne detektere en forværring i patients tilstand.