

## Opgaver ved lav saturation og eventuel opfølgning

Instruksen beskriver opgaver ved lav saturation hos borgere med KOL, der via TeleCare Nord har telemedicinsk udstyr i hjemmet.

Blandt de borgere, der løbende måler saturation, må det forventes, at enkelte vil have en saturation under laveste acceptable niveau på 88 %. Hvis saturationen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau efter fejlretning og yderligere oplæring i hjemmet, kan borgeren komme til en subakut arteriepunktur og vurdering med henblik på ordination eller justering af nasal iltbehandling. Derudover vurderes evt. behov for ekstra ambulans kontrol samt, hvis det fremgår af henvisning/kontakt evt. behov for justering af alarmgrænser for saturation. Dette foregår via hospitalets Lungemedicinske Afdeling eller lungeambulatorium.

Subakut A-punktur foretages indenfor **2 hverdage** efter modtagelse af henvisning og er rettet på borgere tilknyttet TeleCare Nord ifølge Samarbejdsaftale om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

### Aktør

Kommunen.

### Kompetencer

Sundhedsfaglige kompetencer.

### Formål

- At sikre borgere med lav saturation får udredt eventuelt behov for eller justering af nasal iltbehandling.
- At sikre en vurdering af alarmgrænser for saturationsmåling, hvis dette fremgår af henvisning/kontakt.

### Handling

Når saturationen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau skal kommunal sygeplejerske, i samråd med borgeren, kontakte borgerens praktiserende læge eller hospitalet med henblik på yderligere tiltag.

#### Borgeren følges for sin KOL hos praktiserende læge

- Borgerens praktiserende læge kontaktes med henblik på yderligere tiltag.
- Den praktiserende læge kan henvise borgeren til en subakut arteriepunktur og/eller justering af alarmgrænser.
- Det er en fordel, at sygeplejersken fra kommunen kontakter hospitalet telefonisk og informerer om, at henvisning er på vej.
- Læge eller sygeplejerske fra hospitalet sender epikrise til den praktiserende læge med resultat og konklusion samt evt. nye alarmgrænser. Derudover orienterer hospitalet kommunen via korrespondancemeddelelse, så kommunen kan tilrette evt. nye alarmgrænser.

#### Borgeren følges for sin KOL på hospitalet

- Kommunen kan kontakte Lungemedicinsk Afdeling telefonisk i afdelingens aftalte telefontid mhp vurdering af behov for subakut A-punktur og/eller justering af alarmgrænser samt overtagelse af opfølgning på patientens telemedicinske data.
- Læge eller sygeplejerske fra hospitalet informerer kommunen via korrespondancemeddelelse om resultat og konklusion samt evt. nye alarmgrænser så kommunen kan tilrette disse. Derudover sendes epikrise til den praktiserende læge.