

Opgaver ved lav saturation

Instruksen beskriver opgaver ved lav saturation hos borger med KOL tilknyttet TeleCare Nord ifølge Samarbejdsaftale om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Blandt borgere, der løbende måler saturation, må forventes, at enkelte vil have en saturation under laveste acceptable niveau på 88 %. Hvis saturationen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau efter fejlretning og yderligere oplæring i hjemmet, kan borger komme til en subakut arteriepunktur og vurdering med henblik på ordination eller justering af nasalt ilt tilskud. Dette foregår via hospitalets Lungemedicinske Afdeling eller lungeambulatorium. Derudover vurderes evt. behov for justering af grænseværdier for saturation, hvis det fremgår af henvisning/kontakt.

Subakut arteriepunktur foretages indenfor **2 hverdage** efter modtagelse af henvisning/tlf. kontakt.

Aktør

Kommunen.

Kompetencer

Sundhedsfaglige kompetencer.

Formål

- At sikre borger med lav saturation får udredt evt. behov for eller justering af nasal iltbehandling.
- Vurdere ændring af grænseværdier for saturationsmåling, hvis dette fremgår af henvisning/kontakt.

Handling

Når saturationen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau skal kommunal sygeplejerske, i samråd med borger, kontakte borgers praktiserende læge eller hospitalet med henblik på yderligere tiltag.

Borger følges for sin KOL hos praktiserende læge

- Borgers praktiserende læge kontaktes med henblik på yderligere tiltag.
- Den praktiserende læge kan henvise borger til en subakut arteriepunktur og/eller justering af grænseværdier.
- I kontakt til praktiserende skal indgå følgende oplysninger om borger, som praktiserende læge skal anvende ved henvisning til subakut arteriepunktur:
 - Iltbruger og i så fald hvor meget ilt
 - Saturation vanligt og målte værdier
 - Forværring
 - Antibiotika og/eller prednisolon behandling
 - Telefonnr. til patient, pårørende eller kontaktperson
- Derudover skal der, stå at der ønskes tilbagemelding til praktiserende læge **og** korrespondance til kommunen om:
 - Opstart af eller justering af ilt behandling
 - Yderligere kontrol
 - Om grænseværdier kan ændres og til hvad – obs. der skal gøres opmærksom herpå, hvis hospitalet skal tage stilling til dette ved konkret borger

Borgeren følges for sin KOL på hospitalet

- Ved borgere, der er tilknyttet Lungemedicinsk Afdeling, kan kommunen kontakte hospitalet direkte udenom borgerens praktiserende læge.
- Kommunen kan da kontakte Lungemedicinsk Afdeling telefonisk i afdelingens aftalte telefontid mhp vurdering af behov for subakut arteriepunktur og/eller justering af grænseværdier samt overtagelse af opfølgning på patientens telemedicinske data.
- I kontakt til hospitalet skal indgå følgende oplysninger om borger:
 - Iltbruger og i så fald hvor meget ilt
 - Saturation vanligt og målte værdier
 - Forværring
 - Antibiotika og/eller prednisolon behandling
 - Telefonnr. til patient, pårørende eller kontaktperson
- Derudover at der ønskes tilbagemelding til praktiserende læge **og** korrespondance til kommunen om:
 - Opstart af eller justering af ilt behandling
 - Yderligere kontrol
 - Om grænseværdier kan ændres og til hvad - obs. der skal gøres opmærksom herpå, hvis hospitalet skal tage stilling til dette ved konkret borger